

HIGI JA LÕHN LÕPEVAD SIIN



VÄHENDAGE PÜSIVALT KAENLAALUSTE
HIGI, LÕHNA JA KARVU.

MÄRGID, ET TE VÕITE OLLA SOBIV KANDIDAAT



Deodorandi või antiperspirandi kasutamine rohkem kui kord päevas



Riiete vahetamine mitu korda päevas



Higipatjade või -plaastrite kasutamine riiete kaitseks



Duši all käimine rohkem kui kord päevas

MIS ON MIRADRY?

miraDry ravi on protseduur, mille teeb väljaõppinud meditsiinitöötaja ning mis võib kesta vaid ühe tunni.**

3 SAMMU HIGI JA LÕHNA RAVIKS



TUIMESTUS

Maksimaalse mugavuse tagamiseks tehakse enne ravi kohalik tuimestus.



MÄRGISTUS

Nahk märgistatakse raviks ettevalmistamisel ajutise tätoveeringuga.



RAVI

Piirkonda ravitakse miraDry'ga, mis hävitab higi- ja lõhnanäärmed ning vähendab samal ajal kaenlaaluseid karvu.



Püsiv



Kohene



Mittekirurgiline

Lisateave aadressil miraDry.com

MIRADRY EELISED

miraDry on esimene ja ainus FDA heakskiiduga protseduur kaenlaaluse higi ja lõhna vähendamiseks.¹

	TOIMIMISPÕHIMÕTE	TULEMUS	HIGI VÄHENE- MINE	LÕHNA VÄHENEMINE	KARVADE VÄHENEMINE	RAVI SAGEDUS	TAASTUMIS- AEG
	Hävitab soojusenergia abil püsivalt higi- ja lõhnanäärmed	Püsiv	Jah	Jah	Jah	1–2	Vähe või üldse mitte
	Blokeerib ajutiselt higistamist põhjustavaid närvisignaale	Ajutine	Jah	Ei	Ei	2–3 korda aastas	Vähe või üldse mitte
Antiperspirant / deodorant	Blokeerib ajutiselt higikanaleid ja/või varjab lõhna paiksete koostisosadega	Ajutine	Jah	Jah	Ei	Iga päev (pidev kasutamine)	Puudub

OPTIMAALSED TULEMUSED MIRADRY ABIL




Foto miraDry patsiendist pärast treeningut enne miraDry protseduuri.




Foto miraDry patsiendist pärast treeningut pärast miraDry protseduuri.

Tulemused võivad erineda. SkinSpeaks, Edina, MN

Küsige miraDry kohta oma arstilt juba täna!

**Pärast kohalikku tuimestust

Viited: 1. miraDry, Inc andmed. 2. Lupin M, Hong HC, O'Shaughnessy KF. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device. *Dermatol Surg.* 2014;40(7):805-807.

miraDry süsteemil on FDA heakskiit primaarse aksillaarse hüperhidroosi (kaenlaaluste liighigistamise) raviks ja kaenlaaluste karvade püsivaks eemaldamiseks. See võib vähendada ka kaenlaaluste lõhna.

miraDry protseduuri ei tohi teha, kui teil on südamestimulaator või muu implanteeritud elektrooniline seade, vajate lisahapnikku või teil on teadaolev resistentsus või varasem talumatus kohaliku tuimestuse, sealhulgas lidokaiini ja epinefriini suhtes. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on turse, ebamugavustunne või valu, punetus, verevalumid, muhud ja muutunud tundlikkus ravitud piirkonnas. Mõned kõrvaltoimed võivad kesta mõnest päevast mõne nädalani, teised ühest kuni mitme kuuni pärast ravi. Patsientide tulemused ja kogemused võivad erineda.

miraDry® on ettevõtte miraDry, Inc. kaubamärk. © 2026 miraDry, Inc. Kõik õigused kaitstud. Kõik muud registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. MK22196.A