

HIKI JA HAJU LOPPUVAT TÄHÄN



VÄHENNÄ PYSYVÄSTI KAINALOHIKOILUA,
KAINALOHAJUA JA KAINALOKARVOITUSTA.

MERKKEJÄ SIITÄ, ETTÄ VOIT OLLA SOPIVA HOITOO



Deodorantin tai antiperspirantin käyttö useammin kuin kerran päivässä



Vaatteiden vaihtaminen useita kertoja päivässä



Hikisuijien tai -tyynyjen käyttö vaatteiden suojaamiseksi



Suihkussa käynti useammin kuin kerran päivässä

MIKÄ ON MIRADRY?

miraDry-hoito on toimenpide, jonka tekee koulutettu terveydenhuollon ammattilainen, ja se voi kestää vain tunnin.**

3 VAIHETTA HIEN JA HAJUN HOITOO



PUUDUTUS

Paikallispuudutus annetaan, jotta hoito olisi mahdollisimman miellyttävä.



MERKINTÄ

Iho merkitään hoitoa varten väliaikaisella tatuoinnilla.



HOITO

Alue hoidetaan miraDry-laitteella, joka tuhoaa hiki- ja hajurauhaset ja vähentää samalla kainalokarvoitusta.



Pysyvä



Välitön



Ei leikkausta


Lisätietoja osoitteessa miraDry.com

MIRADRYN EDUT

miraDry on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä toimenpide kainalohien ja -hajun vähentämiseen.¹


	TOIMINTAPERIAATE	TULOKSET	HIEN VÄHENE-MINEN	HAJUN VÄHENE-MINEN	KARVOJEN VÄHENE-MINEN	HOITOJEN TIHEYS	TOIPUMISAIKA
	Tuhoaa hiki- ja hajurauhaset pysyvästi lämpöenergialla	Pysyvä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	1–2	Vähän tai ei lainkaan
	Estää tilapäisesti hikoilusta vastaavat hermosignaalit	Tilapäinen	Kyllä	Ei	Ei	2–3 kertaa vuodessa	Vähän tai ei lainkaan
Antiperspirantti / deodorantti	Tukkaa tilapäisesti hikitiehyet ja/tai peittää hajun paikallisesti käytettävillä aineilla	Tilapäinen	Kyllä	Kyllä	Ei	Päivittäin (jatkuva käyttö)	Ei lainkaan

OPTIMAALISET TULOKSET MIRADRY-HOIDOLLA



ENNEN

Kuva miraDry-potilaasta treenin jälkeen ennen miraDry-hoitoa.



JÄLKEEN

Kuva miraDry-potilaasta treenin jälkeen, kun miraDry-hoito on tehty.

Tulokset voivat vaihdella. SkinSpeaks, Edina, MN

Kysy miraDry-hoidosta hoitopaikastasi jo tänään!

****Paikallisuudutuksen jälkeen**

Lähteet: 1. miraDry, Inc:n arkistotiedot. 2. Lupin M, Hong HC, O'Shaughnessy KF. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device. *Dermatol Surg.* 2014;40(7):805-807.

miraDry-järjestelmällä on FDA:n hyväksyntä primaarisen aksillaarisen hyperhidroosin (liiallisen kainalohikoilun) hoitoon ja kainalokarvojen pysyvään poistoon. Se voi myös vähentää kainalohajua.

miraDry-hoitoa ei saa tehdä, jos sinulla on sydämentahdistin tai muu implantoitu elektroninen laite, tarvitset lisäshappia tai sinulla on todettu resistenssi tai aiempi intoleranssi paikallisuudutteille, mukaan lukien lidokaiini ja adrenaliini. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat turvotus, epämukavuus tai kipu, punoitus, mustelmat, kyhmyt ja tuntuu muutokset hoitoalueella. Jotkin haittavaikutukset voivat kestää muutamasta päivästä muutamaan viikkoon, toiset yhdestä useaan kuukauteen hoidon jälkeen. Potilaiden tulokset ja kokemukset voivat vaihdella.

miraDry® on miraDry, Inc:n tavaramerkki. © 2026 miraDry, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki muut rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. MK22196.A